Н. В. Сазонов, И. Е. Мамаева, Т. С. Сафонова

**СИНТЕЗ 6-ОКСО-6,7,8,9-ТЕТРАГИДРО-10Н-ПИРИМИДО-
[5,4-*b*][1,4]БЕНЗОКСАЗИНОВ И 6-ОКСО-6,7,8,9-ТЕТРАГИДРО-
ПИРИМИДО[4,5-*b*][1,4]БЕНЗДИОКСАНОВ**

Реакцией 5-гидрокси-6-аминопиримидинов с 2-бромгидрорезорцином и бромдимедоном в ДМФА в присутствии гидрида натрия получены производные 6,7,8,9-тетрагидро-10Н-пиримидо[5,4-*b*][1,4]бензоксазина. 4-Хлор-5-гидрокси-6-аминопиримидины при взаимодействии с бромдимедоном образуют преимущественно производные 6,7,8,9-тетрагидропиримидо[4,5-*b*][1,4]бенздиоксана. Изучены реакции нуклеофильного замещения атома хлора в положении 4 тетрагидропиримидобензоксазинов с аминами, алкоголями натрия и тиомочевинной. Получены соответствующие амины, алкокси- и тиопроизводные этой трициклической системы.

В сообщениях [1—4] описаны методы получения и свойства 9-оксо-6,7,8,9-тетрагидро- и 9-амино-7,8-дигидропиримидо[4,5-*b*][1,4]бензгиазинов. Среди них обнаружены вещества, тормозящие активность фермента фолиевого обмена — дигидрофолатредуктазы, обладающие противоопухолевой и нейротропной активностью.

В продолжение этих работ нами предпринят синтез производных не описанной в литературе трициклической системы 6,7,8,9-тетрагидро-10Н-пиримидо[5,4-*b*][1,4]бензоксазина. С этой целью исследована реакция 5-гидрокси-6-аминопиримидинов (Ia—г) с бромдигидрорезорцином (IIa) и бромдимедоном (IIб).

Было установлено, что при взаимодействии производных пиримидина Ia—г с бромкетонами IIa,б в ДМФА в присутствии эквимолярного количества гидрида натрия при 55...70 °С образуются 6-оксо-6,7,8,9-тетрагидро-10Н-пиримидо[5,4-*b*][1,4]бензоксазины (IIIa—e) с выходом 42...67%.

Ia,г, IIIa,г,е,ж R¹ = H; Ib,в, IIIб,в,д R¹ = Me;

Iв,г, IIIв-е R² = H; Ia,б, IIIa,б,ж R² = Cl;

IIa, IIIa-г R³ = H; IIб, IIIд-ж R³ = Me

Иные результаты получены при реакции бромдимедона IIб с 4-хлор-5-гидрокси-6-аминопиримидинами Ia,б. Так, при взаимодействии Ia с бромдимедоном в указанных выше условиях из реакционной массы был выделен соответствующий 6-оксопиримидобензоксазин IIIж с выходом 17%. Проведение же этой реакции при более высокой температуре (85...90 °С) привело к получению новой гетероциклической системы — 6,7,8,9-тетрагидропиримидо[4,5-*b*][1,4]бенздиоксана (IVa). Присутствие в реакционной массе соединения IIIж обнаружено только при хроматографировании продукта реакции.

При реакции же 2-метил-4-хлор-5-гидрокси-6-аминопиримидина (Iб) с бромдимедоном в ДМФА в присутствии одного или двух молей гидрида

натрия и температуре 80...90 °С был выделен 4-аминопиримидобенздиоксан IVб с выходом 42%.

Очевидно, первоначально происходит взаимодействие гидроксильной группы пиримидинового цикла с атомом брома бромдимедона. В результате образуется промежуточный эфир А. Далее, благодаря наличию в пиримидиновом фрагменте эфира А аминогруппы и атома хлора, могут протекать два конкурирующих процесса — взаимодействие енольного гидроксила в димедоновом остатке как с аминогруппой, так и с атомом хлора, что и приводит к замыканию оксазинового и диоксанового циклов с образованием трициклических систем IIIж и IVа,б.

Ia, IIIж, IVа R¹ = H; Ib, IVб R¹ = Me

Тетрагидробензоксазины IIIа—ж подобно аналогичным производным тетрагидробензтиазина [3] могут иметь енаминое (Б) или аминное (В) строение.

Выбор между этими структурами в пользу структуры Б был сделан нами на основании ИК и ПМР спектров. Так, в ИК спектрах соединений IIIа—ж имеются полосы поглощения группы NH при 3210...3110 (в кристаллах) и 3400 см⁻¹ (в растворе CHCl₃) и полосы, характерные для валентных колебаний группы CO в области 1655...1645 см⁻¹. В спектрах ПМР этих соединений обнаружен сигнал протона при N₍₁₀₎ (9,22...9,55 м. д.).

Строение 6-оксотетрагидропиримидобенздиоксанов IVа,б подтверждено наличием в их ИК спектрах полос поглощения групп CO и NH в области 1670 и 3130...3375 см⁻¹ соответственно.

На примере 4-хлор-6-оксопиримидобенздиоксазинов IIIа,б были исследованы их реакции с нуклеофильными агентами. Установлено, что при кипячении в *n*-бутанол 4-хлорпиримидобенздиоксазина IIIа с морфолином, пиперидином и *N*-метилпиперазином, а IIIб — с бензиламином образуются соответствующие 4-аминопроизводные Va—г с выходами 62...96%. Обработка веществ IIIа,б метилатом и этилатом натрия дает 4-алкоксизамещенные Vд,е, а взаимодействие IIIб с тиомочевинной приводит к 4-тиопроизводному Vж.

Характеристики синтезированных соединений IIIa—ж, IVa,б, Va—ж

Соединение	Брутто-формула	Найдено, % Вычислено, %			Т _{пл.} , °С	Растворитель для кристаллизации	R _f	ИК спектр*, ν, см ⁻¹		Выход, %
		С	Н	N				СО	NH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IIIa	C ₁₀ H ₈ ClN ₃ O ₂ * ²	<u>50,19</u>	<u>3,40</u>	<u>18,01</u>	261...262	ДМФА—ацетон (1 : 10)	0,50	1640	3110, 3190	59
		50,54	3,39	17,68						
IIIб	C ₁₁ H ₁₀ ClN ₃ O ₂ * ³	<u>52,61</u>	<u>4,11</u>	<u>17,08</u>	281...282	Этанол	0,48	1618	3230	67
		52,49	4,00	16,69						
IIIв	C ₁₁ H ₁₁ N ₃ O ₂	<u>60,95</u>	<u>5,05</u>	<u>19,29</u>	283...284	Этанол		1645	3410	54
		60,82	5,10	19,35						
IIIг	C ₁₀ H ₉ N ₃ O ₂	<u>59,12</u>	<u>4,19</u>	<u>20,99</u>	273...274	Изопропанол		1640	3190	43
		59,11	4,47	20,68						
IIIд	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₂	<u>63,43</u>	<u>6,08</u>	<u>16,94</u>	250...251	Этанол		1645	3140	59
		63,66	6,16	17,13						
IIIе	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₂	<u>62,74</u>	<u>5,64</u>	<u>18,41</u>	255...257	Изопропанол	0,40	1645	3410	42
		62,32	5,67	18,17						
IIIж	C ₁₂ H ₁₂ ClN ₃ O ₂ * ⁴	<u>54,12</u>	<u>4,77</u>		252...253	H ₂ O—этанол (3 : 1)	0,52	1650	3410	17
		54,24	4,55							
IVa	C ₁₂ H ₁₃ N ₃ O ₂	<u>58,16</u>	<u>5,33</u>	<u>17,08</u>	275...276	Этанол	0,57	1670	3130, 3320	39
		58,29	5,30	17,00						
IVб	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₂	<u>59,70</u>	<u>5,89</u>	<u>16,40</u>	265...266	Этанол	0,61	1670	3165, 3375	42
		59,76	5,79	16,08						
Va	C ₁₄ H ₁₆ N ₄ O ₃	<u>58,3</u>	<u>5,82</u>	<u>19,22</u>	270...271	Этанол	0,40	1635	3120	96
		58,32	5,59	19,44						
Vб	C ₁₅ H ₁₈ N ₄ O ₂	<u>62,79</u>	<u>6,60</u>	<u>19,39</u>	261...262	H ₂ O—этанол (1 : 3)	0,37	1655	3120	86
		62,92	6,34	19,57						

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vв	$C_{15}H_{19}N_5O_2$	<u>59,79</u> 59,78	<u>6,50</u> 6,36	<u>23,32</u> 23,24	249...251	Этанол		1638	3130	77
Vг	$C_{19}H_{20}N_4O_2$	<u>68,00</u> 67,83	<u>6,08</u> 5,99	<u>16,55</u> 16,62	262...263	Этанол				62
Vд	$C_{11}H_{11}N_3O_3$	<u>56,63</u> 56,65	<u>4,81</u> 4,75	<u>18,09</u> 18,02	266...267	H_2O -метанол		1645	3405	87
Ve	$C_{13}H_{15}N_3O_3$	<u>59,52</u> 59,76	<u>5,92</u> 5,79	<u>16,13</u> 16,08	238...240	H_2O -этанол		1640	3400	73
Vж	$C_{11}H_{11}N_3O_2S^{*5}$	<u>52,72</u> 52,99	<u>4,68</u> 4,45	<u>16,80</u> 16,86	296...298	H_2O-CH_3COOH				90

* ИК спектры соединений Швд-ж, Vд,e сняты в $CHCl_3$, остальных — в вазелиновом масле.

*2 Найдено, %: Cl 14,65. Вычислено, %: Cl 14,92.

*3 Найдено, %: Cl 14,29. Вычислено, %: Cl 14,09.

*4 Найдено, %: Cl 13,26. Вычислено, %: Cl 13,55.

*5 Найдено, %: S 12,76. Вычислено, %: S 12,86.

Строение соединений Va—в,д,е подтверждено наличием в их ИК спектрах полос поглощения групп CO и NH в области 1635...1655 и 3120...3130 cm^{-1} соответственно.

Исследование действия ряда производных тетрагидропиримидобензоксазинов IIIa—e, Va—ж на активность дигидрофолатредуктазы, выделенной из печени крыс по методике [5], показало, что эти соединения, в отличие от аналогичных производных тетрагидропиримидобензтиазина [1, 2], не ингибируют активность фермента. 2-Метил-4-этокситетрагидропиримидобензоксазин Ve и 4-аминотетрагидропиримидобенздиоксан IVa *in vitro* подавляли рост туберкулезной палочки в концентрации 1 и 0,5 мкг/мл, а 2-метил-4-аминотетрагидропиримидобенздиоксан IVб и 2-метил-4-тиотетрагидропиримидобензоксазин Vж — в концентрации 3,9 мкг/мл.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИК спектры соединений сняты на спектрофотометре Perkin-Elmer в виде суспензий в вазелиновом масле и растворов в CHCl_3 . Спектры ПМР сняты на спектрометре INM-100 в CDCl_3 , внутренний стандарт ТМС. Контроль за ходом реакции и индивидуальностью веществ осуществляли методом ТСХ на пластинке Silufol UV-254 в системе бензол—этилацетат—этанол, 5 : 5,1 : 1,5. Проявление в УФ свете.

Данные элементного анализа и физико-химические характеристики полученных соединений приведены в таблице.

Исходные 4-хлор-5-гидрокси-6-аминопиримидин (Ia) и 2-метил-4-хлор-5-гидрокси-6-аминопиримидин (Iб) синтезированы по методу [6].

2-Метил-5-гидрокси-6-аминопиримидин (Iв). Суспензию 8,25 г (51,8 ммоль) соединения Iб в 100 мл воды и 1 г 5% Pd/C гидрируют 12 ч в автоклаве при 70 °С и 30 атм, охлаждают, катализатор отфильтровывают, фильтрат упаривают до 50 мл, нейтрализуют бикарбонатом натрия, осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат. Получают 5,0 г (78%) соединения Iв, $T_{пл}$ 290...291 °С (с разл., из воды). Найдено, %: С 47,80; Н 5,30; N 33,50. $C_5H_7N_3O$. Вычислено, %: С 48,00; Н 5,60; N 33,60.

Аналогично получен 5-гидрокси-6-аминопиримидин (Iг) из соединения Ia. $T_{пл}$ 250 °С (из воды). По данным [7], $T_{пл}$ 250 °С.

4-Хлор-6-оксо-6,7,8,9-тетрагидро-10Н-пиримидо[5,4-*b*][1,4]бензоксазин (IIIa). К суспензии 0,48 г (20 ммоль) гидрида натрия в 30 мл безводного ДМФА добавляют 2,92 г (20 ммоль) соединения Ia. Смесь перемешивают 10 мин, добавляют 3,82 г (20 ммоль) 2-бромдигидрорезорцина (IIa), нагревают до 55 °С, выдерживают при 55...63 °С 12 ч, охлаждают. Осадок соединения IIIa отфильтровывают, промывают водой, сушат. Упариванием маточного раствора и промыванием осадка водой выделяют дополнительное количество соединения IIIa.

Аналогично из производных пиримидина Iб—е и бромкетона IIa или бромдимедона IIб получены соединения IIIб—е с тем отличием, что при синтезе соединений IIIв,г реакционные смеси нагревают при 70 °С, при синтезе соединения IIIд — 2 ч при 60...65 °С и 4,5 ч при 95...100 °С, при синтезе соединения IIIе — 6 ч при 100...110 °С. Соединения IIIг,е выделяют из реакционных смесей после разбавления водой экстракцией хлороформом.

4-Хлор-6-оксо-8,8-диметил-6,7,8,9-тетрагидропиримидо[5,4-*b*][1,4]бензоксазин (IIIж). К суспензии 0,16 г (6,87 ммоль) гидрида натрия в 20 мл ДМФА добавляют 1,0 г (6,87 ммоль) соединения Ia. Смесь перемешивают 10 мин, добавляют 1,5 г (6,87 ммоль) бромдимедона IIб, выдерживают 14 ч при 55...60 °С, реакционную смесь упаривают досуха, остаток растворяют в 5 мл метанола, раствор пропускают через колонку с окисью алюминия (10 г второй степени активности по Брокману) и элюируют эфиром. Элюат упаривают, остаток растворяют в 5 мл метанола, к раствору добавляют 10 мл воды, выделившийся осадок отфильтровывают и высушивают.

Соединения IIIа—ж — желто-зеленые кристаллические высокоплавкие вещества, растворимые при нагревании в низших спиртах, нерастворимые в воде.

4-Амино-6-оксо-8,8-диметил-6,7,8,9-тетрагидропиримидо[4,5-*b*][1,4]бенздиоксан (IVa). К суспензии 0,48 г (20 ммоль) гидрида натрия в 20 мл ДМФА добавляют 1,45 г (10 ммоль) соединения Ia. Смесь перемешивают 10 мин, добавляют 2,19 г (10 ммоль) бромкетона IIб, перемешивают 20 мин при 20 °С, затем 16 ч при 85...90 °С, охлаждают, выливают в воду (80 мл). Осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат.

Аналогично из соединений Iб и IIб получают соединение IVб с тем отличием, что реакционную смесь нагревают 12 ч, после чего ДМФА отгоняют в вакууме, остаток суспендируют в воде, нейтрализуют уксусной кислотой, отфильтровывают, промывают водой и сушат.

Соединения IVa,б — бесцветные высокоплавкие кристаллические вещества, нерастворимые в воде, растворимые при нагревании в большинстве органических растворителей.

4-Морфолино-4-оксо-6,7,8,9-тетрагидро-10Н-пиримидо[5,4-*b*][1,4]бензоксазин (Va). Суспензию 0,5 г (2,11 ммоль) соединения IIIa, 0,55 г (6,33 ммоль) морфолина в смеси 20 мл *n*-бутанола и 3 мл ДМФА кипятят 4,5 ч, упаривают досуха, к остатку добавляют 10 мл воды, осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат.

Аналогично получают соединения Vб—г с тем отличием, что реакции соединения IIIa с пиперидином и *N*-метилпиперазином, а соединения IIIб — с бензиламином проводят в *n*-бутаноле (4 ч кипячения). Соединения Vв выделяют после отгонки растворителя экстракцией хлороформом.

4-Метокси-6-оксо-6,7,8,9-тетрагидро-10Н-пиримидо[5,4-*b*][1,4]бензоксазин (Vд). К раствору метилата натрия, приготовленному из 0,12 г (0,005 г-ат) натрия в 20 мл безводного метанола, добавляют 0,6 г (2,5 ммоль) соединения IIIa. Смесь нагревают 6 ч в автоклаве при 105...110 °С, упаривают досуха, к остатку добавляют 20 мл воды, нейтрализуют уксусной кислотой, экстрагируют хлороформом (3 × 50 мл), экстракт сушат над Na_2SO_4 и упаривают.

Аналогично получают соединение Ve из IIIб с тем отличием, что реакцию проводят в безводном этаноле (5 ч кипячения).

2-Метил-4-тио-6,7,8,9-тетрагидро-3Н,10Н-пиримидо[5,4-*b*] [1,4]бензоксазин (Vж). Смесь 1,28 г (5,4 ммоль) соединения IIIб и 1,28 г (1,68 ммоль) тиомочевины в 50 мл этанола кипятят 14 ч, охлаждают, осадок отфильтровывают и высушивают.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сафонова Т. С. // Целенаправленный поиск новых противоопухолевых и противовирусных препаратов. — Рига: Зинатне, 1978. — С. 51.
2. Немерюк М. П., Мушников О. Л., Пыхова М. В., Керемов А. Ф., Рябоконт И. А., Ершова Ю. А., Соколова А. С., Сафонова Т. С. // Хим.-фарм. журн. — 1979. — № 8. — С. 51.
3. Полежаева А. И., Рощина Л. Ф., Соколова А. С., Немерюк М. П., Пыхова М. В., Сафонова Т. С., Машковский М. Д. // Хим.-фарм. журн. — 1981. — № 11. — С. 45.
4. Немерюк М. П., Константинова Р. Г., Зиколова С. С., Пыхова М. В., Полежаева А. И., Рощина Л. Ф., Сафонова Т. С., Машковский М. Д. // Хим.-фарм. журн. — 1983. — № 10. — С. 1189.
5. Соколова А. С., Рябоконт И. А., Ершова Ю. А., Андреева Н. А., Немерюк М. П., Сафонова Т. С., Чернов В. А. // Вопр. онкологии. — 1975. — Т. 21. — С. 45.
6. Сазонов Н. В., Сафонова Т. С. // ХГС. — 1972. — № 9. — С. 1285.
7. McOitie J. F. W., Turner A. B. // J. Chem. Soc. — 1963. — N 12. — P. 5590.

Биологические исследования проведены Н.А.Рябоконт (с препаратом дигидрофолатредуктазы) и Л.И. Щербаковой (с туберкулезной палочкой).

Центр по химии лекарственных средств —
Всероссийский научно-исследовательский
химико-фармацевтический институт,
Москва 119815

Поступило в редакцию 01.12.97