И. П. Шведайте

ЦИКЛИЗАЦИЯ N-ДИУКСУСНЫХ АМИНОКИСЛОТ

Проведена циклизация ряда N-диуксусных аминокислот. Установлена зависимость получения продуктов циклизации — 3,5-диоксопиперазиноалканкарбоновых кислот и/или их амидов от температуры, соотношения компонентов и присутствия растворителя.

При нагревании нитрилотриуксусной кислоты в избытке формамида образуется 3,5-диоксо-1-пиперазиноацетамид с выходом 46% [1]. Другие данные о синтезе производных пиперазиндиона-2,6, содержащих остатки аминокислот, отсутствуют. Недавно нами описан метод получения пиперазиндиона-2,6 [2]. В настоящей работе для циклизации ряда N-диуксусных аминокислот — производных соответствующих аминокислот — мы впервые применили формиат аммония. Исходными веществами служили N-диуксусные аминокислоты: нитрилотриуксусная (I), α-аланин-N-диуксусная (II), β-фенил-α-аланин-N-диуксусная (III), β-фенил-β-аланин-N-диуксусная (IV) [3] и описанные нами 4-(N,N-дикарбоксиметиламином)бутановая (V) и 7-(N,N-дикарбоксиметиламином)гептановая (VI) кислоты [4].

Циклизация упомянутых кислот была изучена при различных условиях. Установлено, что в зависимости от температуры, соотношения компонентов и присутствия растворителя получаются различные продукты реакции — (3,5-диоксопиперазин-1-ил)алканкарбоновые кислоты (VII—XII) и/или их амиды (XIII—XV, XVII, XVIII).

I, VII R = CH₂COOH; II, VIII CH(CH₃)COOH; III, IX C₆H₅CH₂CHCOOH;
 IV, X C₆H₅CHCH₂COOH; V, XI (CH₂)₃COOH; VI, XII (CH₂)₆COOH; XIII R¹ = CH₂CONH₂;
 XIV CH(CH₃)CONH₂; XV C₆H₅CH₂CHCONH₂; XVI C₆H₅CHCH₂CONH₂; XVII (CH₂)₃CONH₂;
 XVIII (CH₂)₆CONH₂

В табл.1 представлены данные о зависимости образования продуктов конденсации от температуры, соотношения компонентов и растворителя.

При температуре 120...130 °С, как и в случае циклизации иминодиуксусной кислоты [2], получить продукты циклизации — пиперазиндионы-2,6 — не удалось; были выделены лишь исходные N-диуксусные кислоты. При повышении температуры до 150...160 °С образовывались преимущественно (3,5-диоксопиперазин-1-ил)алканкарбоновые кислоты (VII—IX, XI, XII), но в зависимости от продолжительности реакции, соотношения компонентов и присутствия растворителя выделялось также небольшое количество их амидов. При повышении температуры до 180...190 °С и увеличении продолжительности циклизации образовывались преимущественно амиды (3,5-диоксопиперазин-1-ил)алканкарбоновых кислот (XIII—XV, XVII, XVIII). При кипячении в ДМФА получены соответствующие алканкарбоновые кислоты (VII—IX, XI, XII). При конденсации путем сплавления (метод А) и в случае применения растворителя (метод Б). Оптимальным

Условия и продукты циклизации

Соединение	Молярное соотношение реагентов кислоты : ФА*	Температура, °С	Продолжительность циклизации, ч	Метод	Продукты циклизации (выход, %) ⁴
I	1 : 3	120...130	3	A	I
	1 : 1	150	2	Б	VII
	1 : 1	150	7,5	Б	VII (46,5)
	1 : 1	150	2	A	VII* ²
	1 : 1	150	7,5	A	VII (26,1), III* ²
	1 : 3	150	7,5	A	VII (11,0), II (23,0)
	1 : 3	150...185	3	A	VII* ² , XII (52,6)
II	1 : 3	150...160	3	Б	VIII* ³
	1 : 3	150...160	1	A	VIII* ²
	1 : 3	160...180	4	A	XIV
III	1 : 3	160...180	14	A	XIV (33,6)
	1 : 3	150...160	3	Б	IX (28,2)
	1 : 3	150...180	2	A	IX* ² , XV
	1 : 3	150...180	3	A	IX, XV
	1 : 3	180...190	1,5	A	XV
V	1 : 3	160...190	4	A	XV (41,9)
	1 : 3	150...160	4	Б	XI(45,3)
	1 : 1	150...160	1	A	—
	1 : 1	150...160	2	A	XI, XVIII* ²
VI	1 : 1	150...160	4	A	XI (30,0), XVIII* ²
	1 : 3	160...180	6	A	XI (19,3), XVIII (20,0)
	1 : 1	140...160	0,5	Б	—
	1 : 1	140...160	1,0	Б	XII* ²
	1 : 1	140...160	5	Б	XII
	1 : 1	140...160	10	Б	XII, XVIII* ²
	1 : 3	150...160	0,5	Б	—
	1 : 3	150...160	1	Б	XII* ²
	1 : 3	150...160	10	Б	XII (45,0)
	1 : 3	150...160	0,5	A	—
	1 : 3	150...160	1,0	A	XII*
	1 : 3	150...160	2	A	XII
	1 : 3	150...160	5	A	XII, XVIII* ²
	1 : 3	150...160	10	A	XII (36,4), XVIII* ²
	1 : 3	160...190	4	A	XII* ² , XVIII (34,8)
	1 : 3	160...190	10	A	XVIII (45,0)

* Формиат аммония.

*² Следы вещества (ТСХ).*³ Очистка от смолянистых примесей затруднительна.*⁴ Указаны самые высокие выходы.

соотношением исходной кислоты и формиата аммония является 1 : 3. Уменьшение количества формиата аммония способствует образованию алканкарбоновых кислот (VII—IX, XI, XII), увеличению продолжительности реакции и осмолению реакционной смеси.

Характеристика соединений VII, IX, XI—XV, XVII, XVIII

Соединение	Брутто-формула	Найдено. % Вычислено, %			T _{пл} , °C (растворитель)	R _f (система ТСХ)	Выход, %
		C	H	N			
VII	C ₆ H ₈ N ₂ O ₄	41,74	4,73	16,10	185...187 (изопропанол)	0,53 (Г)	46,5
		41,86	4,65	16,26			
IX	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₄	59,38	5,29	10,40	186...188 (изопропанол)	0,74 (А)	28,2
		59,54	5,38	10,68			
XI	C ₈ H ₁₂ N ₂ O ₄	48,11	6,02	13,97	128...130 (изопропанол)	0,83 (Б)	30,0
		47,99	6,04	13,99			
XII	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O ₄	54,50	7,50	11,53	103...105 (изопропанол)	0,83 (Б)	36,4
		54,53	7,49	11,56			
XIII	C ₆ H ₉ N ₃ O ₃	—	—	—	212...215 (этанол—вода)	0,39 (Г)	52,6
XIV	C ₇ H ₁₁ N ₃ O ₃	—	—	—	195...198 (этанол—вода)	0,65 (Г)	33,6
		—	—	—			
XV	C ₁₃ H ₁₅ N ₃ O ₃	59,90	5,48	15,99	200...202 (этанол—вода)	0,66 (Б)	62,7
		59,76	5,79	16,08			
XVII	C ₈ H ₁₃ N ₃ O ₃	48,20	6,45	21,09	149...152 (этанол—вода)	0,23 (Б)	52,3
		48,23	6,58	21,10			
XVIII	C ₁₁ H ₁₉ N ₃ O ₃	54,68	8,10	17,70	136...139 (этанол—вода)	0,48 (Б)	45,0
		54,75	7,94	17,42			

Невысокие выходы (28...63%) продуктов конденсации обусловлены декарбокислированием исходных кислот при высокой температуре, трудностью разделения продуктов (в случае образования двух продуктов реакции), потерями при очистке от смолообразных примесей.

α -Аланин- (II) и β -фенил- α -аланин-N-диуксусные (III) кислоты легко декарбокислируются при нагревании [3]. Доказано, что декарбокислирование идет за счет карбоксильного остатка исходной аминокислоты, а не карбоксиллов иминодиуксусной кислоты. При циклизации упомянутых кислот с формиатом аммония при высокой температуре не наблюдалось образование 4-алкильных производных пиперазиндиона-2,6, продуктов циклизации декарбокислировавшихся α -аланин- и β -фенил- α -аланин-N-диуксусных кислот (декарбокислирование N-диуксусных α -аминокислот, видимо, идет по другому механизму, нежели указано в работе [3]).

При конденсации α -аланин-N-диуксусной кислоты III с формиатом аммония удалось выделить и идентифицировать лишь α -(3,5-диоксопиперазин-1-ил)пропионамид (XIV). Второй продукт циклизации наблюдали с помощью ТСХ (R_f 0,50, система Г), выделить и идентифицировать который не удалось. Можно предположить, что это примеси α -(3,5-диоксопиперазин-1-ил)пропионовой кислоты (VIII), имеющей величину R_f , близкую для (3,5-диоксопиперазин-1-ил)уксусной кислоты (VII).

При конденсации β -фенил- β -аланин-N-диуксусной кислоты (IV) с формиатом аммония как путем сплавления (метод А), так и в ДМФА (метод

Спектры ПМР соединений VII, IX, XI—XV, XVII, XVIII

Соединение	Химические сдвиги, δ , м. д.
VII	3,22 (2H, с, COCH ₂ N); 3,33 (4H, с, NCH ₂ CO); 10,96 (1H, уш. с, NH)
IX	3,12 (2H, д, $J = 6$ Гц, CH ₂); 3,31 (4H, с, NCH ₂ CO); 4,69 (1H, м, CH); 7,18 (5H, уш. с, C ₆ H ₅); 11,45 (1H, уш. с, NH)
XI	1,61 (2H, к, $J = 6$ Гц, CH ₂); 2,16 (2H, т, $J = 7$ Гц, CH ₂ N); 3,22 (4H, с, NCH ₂ CO); 11,03 (1H, уш. с, NH)
XII	1,29 (10H, м, CH ₂); 2,18 (2H, т, $J = 7$ Гц, CH ₂ N); 3,25 (4H, с, NCH ₂ CO); 11,05 (1H, уш. с, NH)
XIII	3,00 (2H, с, COCH ₂ N); 3,31 (4H, с, NCH ₂ CO); 7,00, 7,28 (2H, уш. с, NH ₂); 11,00 (1H, уш. с, NH)
XIV	1,21 (3H, д, $J = 7$ Гц, CH ₃); 3,05 (4H, с, NCH ₂ CO); 3,42 (1H, к, $J = 6$ Гц, CH); 7,00, 7,28 (2H, уш. с, NH ₂); 11,05 (1H, уш. с, NH)
XV	3,14 (2H, м, CH ₂); 3,34 (4H, с, NCH ₂ CO); 3,69 (1H, м, CH); 6,70, 6,94 (2H, уш. с, NH ₂); 7,18 (5H, уш. с, C ₆ H ₅); 11,03 (1H, уш. с, NH)
XVII	1,63 (2H, к, $J = 5$ Гц, CH ₂); 2,01 (2H, т, $J = 7$ Гц, CH ₂ N); 2,36 (2H, т, $J = 7$ Гц, CH ₂ CO); 3,19 (2H, с, NCH ₂ CO); 3,25 (2H, с, NCH ₂ CO); 6,57, 7,13 (2H, уш. с, NH ₂); 11,05 (1H, уш. с, NH)
XVIII	1,22 (10H, м, CH ₂); 1,96 (2H, м, CH ₂ N); 3,22 (4H, уш. с, NCH ₂ CO); 6,53, 7,09 (2H, уш. с, NH ₂); 11,03 (1H, уш. с, NH)

Б) получить производные пиперазиндиона-2,6 не удалось — наблюдалось образование основного продукта — коричной кислоты (R_f 0,90) и примеси (R_f 0,72) (система А). Коричная кислота была выделена из реакционной смеси путем сублимации: ее структура доказана данными спектров ПМР и элементного анализа, а также по характерному запаху. Второй продукт из сильно осмоленной реакционной смеси выделить не удалось. Можно предположить, что это β -(3,5-диоксопиперазин-1-ил)- β -фенилпропионовая кислота (X), имеющая величину R_f , близкую для α -(3,5-диоксопиперазин-1-ил)- β -фенилпропионовой кислоты (IX). Декарбокислирование β -фенил- β -аланин-N-диуксусной кислоты (IV) проходит не только при высокой температуре в щелочной среде, но и при нагревании при 150 °С как в ДМФА, так и в его отсутствие. Продуктом декарбокислирования также является коричная кислота.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Температуры плавления синтезированных веществ определяли на микронагревательном столике Voetius. Спектры ПМР снимали в ДМСО-D₆ на спектрометре Hitachi R-22 (90 МГц), внутренний стандарт ГМДС. Контроль за ходом реакций и индивидуальностью веществ осуществляли методом ТСХ на пластинках Silufol UV-254 в системах ацетон—хлороформ (1 : 1, система А; 3 : 1, система Б; 1 : 3, система В), хлороформ—метанол (1 : 1, система Г). Пятна проявляли раствором, приготовленным из 1,83 г CoCl₂ · 6H₂O, 2 г K₂Cr₂O₇, 10 мл ледяной уксусной кислоты и 100 мл H₂O (голубые пятна для циклических имидов). Данные элементных анализов соответствуют вычисленным.

Выходы и аналитические характеристики синтезированных соединений приведены в табл. 2, спектры ПМР — в табл. 3.

Общая методика циклизации N-диуксусных аминокислот. А. Хорошо измельченную смесь из N-диуксусной аминокислоты и формиата аммония нагревают на масляной бане. Конец конденсации определяют по выделению паров аммиака (рН 9...10) и с помощью ТСХ. Реакционную массу темного цвета заливают метанолом и выдерживают при -18 °С 12 ч. Осадок отфильтровывают, промывают метанолом, высушивают. После обработки активированным углем и перекристаллизации получают соответствующие продукты циклизации.

Б. Смесь из *N*-диуксусной аминокислоты и формиата аммония кипятят в ДМФА. Ход реакции контролируют с помощью ТСХ. После конденсации ДМФА упаривают в вакууме, остаток заливают метанолом и выдерживают при -18°C 12 ч. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают метанолом; получают соответствующие продукты циклизации. В случае образования нескольких продуктов конденсации, реакционную смесь пропускают через колонку с силикагелем марки Сешарол 40/100. Элюируют этилацетатом или смесью ацетон—хлороформ (3 : 1) (контроль ТСХ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pat. 1170399 Brit. / Grace W. R. and Co. // С. А. — 1970. — Vol. 72. — 54804.
2. Шведайте И. П. // ХГС. — 1995. — № 1. — С. 73.
3. Казаринова Н. Ф., Латош Н. И., Постовский И. Я. // Изв. СО АН СССР. — 1960. — № 2. — С. 60.
4. Шведайте И. П., Чекуолене Л. В., Казлаускас Д. А. // Тр. АН ЛитССР. Сер. Б. — 1984. — Т. 2. — С. 35.

*Институт биохимии Литовской
Республики, Вильнюс 2600
e-mail: getam@ktl.mii.lt*

Поступило в редакцию 17.04.98